



**Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

Facultad de Medicina

Unidad de Posgrado

Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana

**Comportamiento epidemiológico de la mortalidad  
materna ocurridos en la región - Callao periodo enero  
2000 - diciembre 2012**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN**

Para optar el Título de Especialista en Gineco-Obstetricia

**AUTOR**

Karen Asunta SEGOVIA CONCHA

**ASESOR**

Julio Raymundo AGUILAR FRANCO

Lima, Perú

2014

## RESUMEN

**Objetivos:** Describir el comportamiento epidemiológico de los casos de Muerte Materna ocurridos en la Región Callao entre el periodo de enero del 2000 y diciembre del 2012.

**Material y Métodos:** El estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo y observacional. Se revisaron las Fichas de Investigación Epidemiológica pertenecientes a la DIRESA de la Región Callao del 1 de enero de 2000 al 31 de Diciembre del 2012. Se seleccionaron pacientes por muerte obstétrica. Se utilizó estadística descriptiva, con medidas de tendencia central y desviación estándar.

**Resultados:** Se registraron 109 muertes maternas de origen obstétrico. La tasa de muerte materna fue de 62.82 Por cada 100 000 nacidos vivos durante los 13 años. El 62 % correspondió a causas obstétricas directas y el 34 % a obstétricas indirectas. La edad se correspondió entre 26 y 35 años, en 76 casos eran multigestas. La mayoría tenía nivel secundaria en el 42.2%. Solo un 23.9% tuvo control prenatal adecuado frente al 42.2% de casos con control prenatal inadecuado. La vía de término de gestación fue más por vía cesárea con 50.5%. La eclampsia fue causa de muerte en el 9.2%, la Preeclampsia en el 17.4%, la hemorragia obstétrica en 19.3% y las infecciones en 16.5%.

**Conclusiones:** Se observó una tendencia variable en el comportamiento epidemiológico de la tasa de mortalidad materna en el periodo estudiado, pero se encontró un incremento del número de casos de muerte materna por año hacia la mitad del periodo estudiado. La Preeclampsia –eclampsia y la hemorragia obstétrica son aun las principales causas de defunción materna. Los casos de muerte materna correspondieron a mujeres de edad media, multigestas con control prenatal inadecuado y la cesárea predominó como vía de término del embarazo.

**Palabras Claves:** mortalidad materna, comportamiento epidemiológico, Preeclampsia.

## RESUMEN

**Objetivos:** Describir el comportamiento epidemiológico de los casos de Muerte Materna ocurridos en la Región Callao entre el periodo de enero del 2000 y diciembre del 2012.

**Material y Métodos:** El estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo y observacional. Se revisaron las Fichas de Investigación Epidemiológica pertenecientes a la DIRESA de la Región Callao del 1 de enero de 2000 al 31 de Diciembre del 2012. Se seleccionaron pacientes por muerte obstétrica. Se utilizó estadística descriptiva, con medidas de tendencia central y desviación estándar.

**Resultados:** Se registraron 109 muertes maternas de origen obstétrico. La tasa de muerte materna fue de 62.82 Por cada 100 000 nacidos vivos durante los 13 años. El 62 % correspondió a causas obstétricas directas y el 34 % a obstétricas indirectas. La edad se correspondió entre 26 y 35 años, en 76 casos eran multigestas. La mayoría tenía nivel secundaria en el 42.2%. Solo un 23.9% tuvo control prenatal adecuado frente al 42.2% de casos con control prenatal inadecuado. La vía de termino de gestación fue más por vía cesárea con 50.5%. La eclampsia fue causa de muerte en el 9.2%, la Preeclampsia en el 17.4%, la hemorragia obstétrica en 19.3% y las infecciones en 16.5%.

**Conclusiones:** Se observó una tendencia variable en el comportamiento epidemiológico de la tasa de mortalidad materna en el periodo estudiado, pero se encontró un incremento del número de casos de muerte materna por año hacia la mitad del periodo estudiado. La Preeclampsia – eclampsia y la hemorragia obstétrica son aun las principales causas de defunción materna. Los casos de muerte materna correspondieron a mujeres de edad media, multigestas con control prenatal inadecuado y la cesárea predominó como vía de término del embarazo.

**Palabras Claves:** mortalidad materna, comportamiento epidemiológico, Preeclampsia.